

# Momento Lineal, Momento Angular & Momento Radial

Antonio A. Blatter

Licencia Creative Commons Atribución 3.0  
(2015) Buenos Aires  
Argentina

Este trabajo presenta el momento lineal, el momento angular y el momento radial de un sistema de  $N$  partículas, que dan origen a las leyes de conservación del momento lineal, del momento angular y de la energía.

## Momento Lineal

El momento lineal  $\mathbf{P}$  de un sistema de  $N$  partículas con respecto a un punto  $O$  (con posición  $\mathbf{R}_o$ , velocidad  $\mathbf{V}_o$  y aceleración  $\mathbf{A}_o$ ) está dado por:

$$\mathbf{P} = \sum_i m_i (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o)$$

$$d(\mathbf{P})/dt = \sum_i m_i (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o)$$

$$\mathbf{F} = \sum_i (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_o)$$

La ecuación ( $\mathbf{F}$ ) sólo puede ser válida si el punto  $O$  logra que  $\mathbf{A}_o$  sea igual a cero. Por lo general, en el momento lineal el punto  $O$  es el origen  $O$  del sistema de referencia, logrando que  $\mathbf{R}_o$ ,  $\mathbf{V}_o$  y  $\mathbf{A}_o$  sean siempre iguales a cero. Sin embargo, el punto  $O$  no necesariamente tiene que ser el origen  $O$  del sistema de referencia. La única condición aquí es que la aceleración  $\mathbf{A}_o$  del punto  $O$  debe ser igual a cero.

Ahora, relacionando  $\mathbf{P}$  y  $\mathbf{F}$  con las magnitudes lineales  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{a}$ , se obtiene:

$$\mathbf{P} = M \mathbf{v}$$

$$d(\mathbf{P})/dt = \mathbf{F} = M \mathbf{a}$$

donde  $M (= \sum_i m_i)$  es la masa del sistema de partículas,  $\mathbf{v}$  y  $\mathbf{a}$  son la velocidad y la aceleración (lineales) del sistema de partículas (con respecto al punto  $O$ )

Por lo tanto, se deduce que el momento lineal  $\mathbf{P}$  de un sistema aislado de  $N$  partículas permanece constante si las fuerzas internas  $\mathbf{F}_{(int)}$  logran anularse.

## Momento Angular

El momento angular  $\mathbf{L}$  de un sistema de  $N$  partículas con respecto a un punto  $O$  (con posición  $\mathbf{R}_o$ , velocidad  $\mathbf{V}_o$  y aceleración  $\mathbf{A}_o$ ) está dado por:

$$\mathbf{L} = \sum_i m_i [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o)]$$

$$d(\mathbf{L})/dt = \sum_i m_i [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) \times (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o)]$$

$$\mathbf{M} = \sum_i [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) \times (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_o)]$$

La ecuación ( $\mathbf{M}$ ) sólo puede ser válida si el punto  $O$  logra que  $\mathbf{A}_o$  sea igual a cero o si el punto  $O$  es el centro de masa del sistema de partículas, puesto que:

$$\sum_i [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm}) \times (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_{cm})] = \sum_i [(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm}) \times \mathbf{F}_i]$$

Ahora, relacionando  $\mathbf{L}$  y  $\mathbf{M}$  con las magnitudes angulares  $\boldsymbol{\omega}$  y  $\boldsymbol{\alpha}$ , se obtiene:

$$\mathbf{L} = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega}$$

$$d(\mathbf{L})/dt = \mathbf{M} = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\alpha} + \dot{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega}$$

donde  $\mathbf{I}$  es el tensor de inercia del sistema de partículas,  $\boldsymbol{\omega}$  y  $\boldsymbol{\alpha}$  son la velocidad y la aceleración (angulares) del sistema de partículas (con respecto al punto  $O$ )

$$\mathbf{I} = \sum_i m_i [|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o|^2 \mathbf{1} - (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) \otimes (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

$$\dot{\mathbf{I}} \cdot \boldsymbol{\omega} = -(\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2)$$

$$\mathbf{M}_1 = -\sum_i m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) \times \{2\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o)\}$$

$$\mathbf{M}_2 = +\sum_i m_i (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) \times \{\boldsymbol{\omega} \times [\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]\}$$

Si  $\mathbf{M}_1$  y  $\mathbf{M}_2$  son considerados como momentos «ficticios» de manera tal que resulte la igualdad ( $\mathbf{M}^* = \mathbf{M} + \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2$ ) entonces se logra:

$$\mathbf{L} = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{M}^* = \mathbf{I} \cdot \boldsymbol{\alpha}$$

Por lo tanto, se deduce que el momento angular  $\mathbf{L}$  de un sistema aislado de  $N$  partículas permanece constante si los momentos internos  $\mathbf{M}_{(int)}$  logran anularse.

## Momento Radial

El momento radial  $G$  de un sistema de  $N$  partículas con respecto a un punto  $O$  (con posición  $\mathbf{R}_o$ , velocidad  $\mathbf{V}_o$  y aceleración  $\mathbf{A}_o$ ) está dado por:

$$G = \sum_i 1/2 m_i [(\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

$$\Delta G = \sum_i \Delta 1/2 m_i [(\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

$$d(\Delta G)/dt = \sum_i \Delta 1/2 m_i [(\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) + (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

$$d(\Delta G)/dt = \sum_i m_i [\Delta 1/2 (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) + \Delta 1/2 (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

$$d(\Delta G)/dt = \sum_i m_i [\int_1^2 (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) + \Delta 1/2 (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

$$\Delta T = \sum_i [\int_1^2 (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_o) \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) + \Delta 1/2 (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

La ecuación  $(\Delta T)$  sólo puede ser válida si el punto  $O$  logra que  $\mathbf{A}_o$  sea igual a cero o si el punto  $O$  es el centro de masa del sistema de partículas, puesto que:

$$\sum_i [\int_1^2 (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_{cm}) \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm})] = \sum_i [\int_1^2 \mathbf{F}_i \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm})]$$

$$\sum_i [\Delta 1/2 (\mathbf{F}_i - m_i \mathbf{A}_{cm}) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm})] = \sum_i [\Delta 1/2 \mathbf{F}_i \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_{cm})]$$

Ahora, relacionando  $G$  y  $T$  con las magnitudes radiales  $r$ ,  $\dot{r}$  y  $\ddot{r}$ , se obtiene:

$$\Delta G = \Delta 1/2 M (\dot{r} r)$$

$$d(\Delta G)/dt = \Delta T = \Delta 1/2 M (\dot{r} \dot{r} + \ddot{r} r)$$

donde  $M$  es la masa del sistema de partículas,  $(\dot{r} r)$  y  $(\dot{r} \dot{r} + \ddot{r} r)$  son la velocidad y la aceleración (escalares) del sistema de partículas (con respecto al punto  $O$ )

La posición escalar, la velocidad escalar y la aceleración escalar de un sistema de partículas formado por una sola partícula, están dadas por:

$$\text{Posición escalar:} \quad 1/2 (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) \quad = \quad 1/2 (\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}) \quad = \quad 1/2 (r r)$$

$$\text{Velocidad escalar:} \quad 1/2 d(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})/dt \quad = \quad (\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}) \quad = \quad (\dot{r} r)$$

$$\text{Aceleración escalar:} \quad 1/2 d^2(\mathbf{r} \cdot \mathbf{r})/dt^2 \quad = \quad (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) \quad = \quad (\dot{r} \dot{r} + \ddot{r} r)$$

donde  $\mathbf{r}_i$  es el vector de posición de la partícula,  $\mathbf{r} = (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)$  y  $r = |(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)|$

Ahora, si  $\Delta T$  es considerado como el trabajo  $W$  realizado por las fuerzas que actúan sobre un sistema de partículas, entonces:

$$W = \sum_i [\int_1^2 \mathbf{F}_i \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) + \Delta^{1/2} \mathbf{F}_i \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

Por lo tanto, siempre resulta la siguiente igualdad:

$$W = \sum_i \Delta^{1/2} m_i [(\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) + (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

Si la expresión del lado derecho de la igualdad anterior es considerada como la variación en la energía cinética  $K$  de un sistema de partículas, entonces:

$$\Delta K = \sum_i \Delta^{1/2} m_i [(\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{V}_o) + (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

Por lo tanto, siempre resulta también la siguiente igualdad:  $W = \Delta K$

Ahora, dado que el trabajo  $W$  realizado por las fuerzas conservativas que actúan sobre un sistema de partículas es igual y de signo opuesto a la variación en la energía potencial  $U$  del sistema de partículas, entonces:

$$\Delta U = - \sum_i [\int_1^2 \mathbf{F}_i \cdot d(\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) + \Delta^{1/2} \mathbf{F}_i \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o)]$$

Por lo tanto, se deduce que la energía mecánica  $E$  de un sistema de  $N$  partículas permanece constante si el sistema está sujeto sólo a fuerzas conservativas.

$$\Delta E = \Delta K + \Delta U = 0 \quad \rightarrow \quad E = K + U = \text{constante}$$

Las magnitudes  $E$ ,  $K$  y  $U$  están relacionadas con las magnitudes convencionales  $E'$ ,  $K'$  y  $U'$ . De hecho, la energía mecánica  $E$  de un sistema de partículas es igual a la energía mecánica convencional  $E'$  del sistema de partículas ( $E = E'$ ) puesto que:

$$\sum_i^{1/2} m_i (\mathbf{a}_i - \mathbf{A}_o) \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) - \sum_i^{1/2} \mathbf{F}_i \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_o) = 0$$

Sin embargo, si todos los sistemas de referencia inerciales y no inerciales eligen el mismo punto  $O$  (el centro de masa del sistema de partículas) entonces las magnitudes  $E$ ,  $K$  y  $U$  son invariantes bajo transformaciones entre sistemas de referencia y los sistemas de referencia no inerciales no deben introducir las fuerzas ficticias sobre  $\mathbf{F}_i$ .

En esta sección, por lo tanto, se obtienen las siguientes relaciones:

$$G = 1/2 M (\dot{r} r)$$

$$d(G)/dt = 1/2 M (\dot{r} \dot{r} + \ddot{r} r) = K$$

$$d(\Delta G)/dt = \Delta T = \Delta^{1/2} M (\dot{r} \dot{r} + \ddot{r} r) = W = \Delta K$$

## Observaciones

Todas las ecuaciones de este trabajo pueden ser aplicadas en cualquier sistema de referencia inercial o no inercial.

Los sistemas de referencia no inerciales en la sección Momento Lineal y en la sección Momento Angular sí deben introducir las fuerzas ficticias sobre  $\mathbf{F}_i$ .

Los sistemas de referencia no inerciales en la sección Momento Radial no deben introducir las fuerzas ficticias sobre  $\mathbf{F}_i$  (en  $T$ , en  $W$  y en  $U$ ) si el punto  $O$  es el centro de masa del sistema de partículas.

El momento lineal de un sistema de partículas está relacionado con las magnitudes lineales y especialmente con la velocidad lineal ( $m/s$ ) del sistema de partículas.

El momento angular de un sistema de partículas está relacionado con las magnitudes angulares y especialmente con la velocidad angular ( $rad/s$ ) del sistema de partículas.

El momento radial de un sistema de partículas está relacionado con las magnitudes radiales y especialmente con la velocidad escalar ( $m^2/s$ ) del sistema de partículas.

La energía mecánica  $E$ , la energía cinética  $K$  y la energía potencial  $U$  de un sistema de partículas están relacionadas con las magnitudes radiales y especialmente con la aceleración escalar ( $m^2/s^2$ ) del sistema de partículas.

Si el punto  $O$  es el centro de masa de un sistema de partículas entonces la energía mecánica  $E$ , la energía cinética  $K$  y la energía potencial  $U$  del sistema de partículas son invariantes bajo transformaciones entre sistemas de referencia.

La energía mecánica  $E$  de un sistema de partículas es igual a la energía mecánica convencional  $E'$  del sistema de partículas ( $E = E'$ )

## Bibliografía

**A. Einstein**, Sobre la Teoría de la Relatividad Especial y General.

**G · Gamow**, Uno, Dos, Tres, ... Infinito.

**E. Mach**, La Ciencia de la Mecánica.

**H. Goldstein**, Mecánica Clásica.